

Застосування препарату **ЛЕМТРАДА**¹ може підвищити ризик виникнення:

Аутоімунних захворювань, таких як:

- > порушення згортання крові, яке називається імунна тромбоцитопенічна пурпура (ІТП)
- > рідкісні порушення функції нирок, наприклад, захворювання з утворенням антитіл до базальної мембрани клубочків [анти-БМК-хвороба]
- > порушення функції щитоподібної залози (гіпо-/гіпертиреоз)

Тяжких інфекційних захворювань

¹ Лемтрада, концентрат для розчину для інфузій по 12 мг/1,2 мл, Р.П. № UA/17376/01/01. Наказ МОЗ України №978 від 26.04.2019.

Лікарі: Більш докладну інформацію див. в інструкції для медичного застосування лікарського засобу ЛЕМТРАДА¹

¹ Лемтрада, концентрат для розчину для інфузій по 12 мг/1,2 мл, Р.П. № UA/17376/01/01. Наказ МОЗ України №978 від 26.04.2019.

		Медична сестра-спеціаліст в галузі розсіяного склерозу
		Лікар загальної практики
		Невропатолог
Прізвище	Номер телефону	

Підпис пацієнта:

Прізвище пацієнта:

З невропатологом, який призначив мені препарат **ЛЕМТРАДА**¹, можна зв'язатися за телефоном, наведеним нижче. Можуть бути зазначені також лікарі або інші медичні працівники, залучені до мого лікування. При проведенні будь-яких обстежень передайте копії усіх медичних документів, включаючи з призначенням лікарських засобів та/або результатів аналізів, лікарів (я-м), зазначених нижче.

Картка-пам'ятка пацієнта

Постійно носіть цю картку-пам'ятку із собою та показуйте її всім медпрацівникам для інформування, що Ви отримували лікування препаратом ЛЕМТРАДА¹

Я отримую лікування препаратом ЛЕМТРАДА проти розсіяного склерозу (РС), який впливає на імунну систему. Я беру участь у спеціальній програмі моніторингу, в рамках якої контроль здійснюється щомісяця під час лікування та протягом 4 років після останнього курсу лікування.

ЛЕМТРАДА
а-лемтузумаб^{12мг/1,2мл}

Що Ви маєте знати про препарат ЛЕМТРАДА¹ (алемтузумаб)

Необхідно звертати увагу на значущі побічні реакції:

Одразу зателефонуйте своєму невропатологу, якщо у Вас з'явилися вперше, посилилися або повторно виникли вказані нижче симптоми. Якщо Ви не можете зв'язатися зі своїм лікарем, зверніться за невідкладною медичною допомогою. Покажіть медичним працівникам цю картку!

Імунна тромбоцитопенічна пурпура (ІТП)

- > Невеликі спорадичні цятки червоного, рожевого або пурпурного кольору на шкірі
- > Схильність до утворення синців
- > Кровотеча при порізі, яку складніше зупинити, аніж зазвичай
- > Кровоточивість ясен або кровотечі з носу, яких раніше не було, або які складніше зупинити, ніж зазвичай
- > Більш інтенсивні, тривалі або часті менструації, ніж зазвичай
- > Кровотечі між менструаціями або більш інтенсивні менструальні кровотечі
- > Кровохаркання (також може бути ознакою порушення функції нирок)

Порушення функції нирок

- > Сеча з домішками крові, яка може мати червоний колір або колір чаю
- > набряк ніг або стоп

Тяжкі інфекційні захворювання

- > Гарячка та/або озноб
- > Збільшення лімфовузлів
- > Задишка, кашель, дихання з хрипом або свистом, біль або відчуття тиску в грудях, кровохаркання

Побічні ефекти можуть виникати протягом тривалого часу після завершення курсу лікування препаратом ЛЕМТРАДА.

Дуже важливо, щоб Ви продовжували щомісяця здавати аналізи (навіть якщо Ви добре себе почуваєте).



Виявлення та діагностування захворювань на ранньому етапі забезпечує найкращі результати лікування.



Ви також маєте й надалі звертати увагу на відповідні ознаки та симптоми.



Це необхідно робити протягом 4 років після останнього курсу лікування препаратом ЛЕМТРАДА.

ЛЕМТРАДА
алемтузумаб^{12мг}

¹Інструкція для медичного застосування препарату Лемтрада, концентрат для розчину для інфузій по 12 мг/1,2 мл, Р.П. № UA/17374/01/01. Наказ МОЗ України №978 від 26.04.2019.