

Частина VI: Резюме плану управління ризиками

Резюме плану управління ризиками щодо препарату **ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ**, супозиторії ректальні по 1405 мг, по 6 супозиторіїв у стрипі; по 1 або по 2 стрипи у пачці з картону.

Це резюме плану управління ризиками (ПУР) для препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг. У ПУР деталізовано важливі ризики щодо препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг та, описано як ці ризики можуть бути мінімізовані і як можна отримати більше інформації щодо ризиків та невизначених факторів (відсутня інформація) для препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг.

Коротка характеристика лікарського засобу Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг (КХЛЗ) та Інструкція для медичного застосування препарату надають основну інформацію для спеціалістів у галузі охорони здоров'я та пацієнтів щодо того, як слід застосовувати препарат Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг. Важливі нові фактори небезпеки або зміни до поточної версії будуть включені до оновленого ПУР для препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг.

I. Лікарський засіб та для чого він застосовується

Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг, застосовують для симптоматичного лікування запорів різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).

II. Ризики, пов'язані з лікарським засобом та заходи щодо мінімізації чи подальшої деталізації ризиків

Важливі ризики щодо препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг, разом із заходами щодо мінімізації таких ризиків та запропонованими дослідженнями для більш детального вивчення ризиків препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг, викладено нижче.

Заходи з мінімізації ризиків, визначені для лікарських засобів, можуть включати:

- Спеціальну інформацію, таку як попередження, застереження та рекомендації щодо правильного застосування, в Інструкції для медичного застосування та КХЛЗ, призначених для пацієнтів та спеціалістів у галузі охорони здоров'я;
- Важлива інформація на упаковці лікарського засобу;
- Дозволений розмір упаковки – кількість лікарського засобу в упаковці обрана таким чином, аби забезпечити правильне застосування препарату;
- Категорія відпуску лікарського засобу – метод отримання лікарського засобу пацієнтом (тобто, з або без рецепту), який може мінімізувати пов'язані з ним ризики.

Всі разом ці заходи становлять рутинні заходи з мінімізації ризиків.

На додаток до цих заходів постійно збирається та регулярно аналізується інформація про побічні реакції, включаючи оцінку PSUR (регулярно оновлюваного звіту з безпеки) та діяльність з виявлення сигналів з безпеки лікарського засобу, аби, за потреби, можна було застосувати негайні заходи. Ці заходи є рутинною діяльністю з фармаконагляду.

II.A Список важливих ризиків та відсутньої інформації

Важливі ризики для препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг – це ризики, які потребують спеціальної діяльності з управління ними для подальшого дослідження або мінімізації ризику, аби цей лікарський засіб було безпечно застосовувати.

Важливі ризики діляться на ідентифіковані та потенційні.

Ідентифіковані ризики – це фактори небезпеки, щодо яких існують достатні свідчення зв'язку із використанням препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг.

Потенційні ризики – це фактори небезпеки, щодо яких зв'язок з використанням цього лікарського засобу можливий, виходячи з наявних даних, але такий зв'язок ще не встановлений і потребує подальшої оцінки. Відсутня інформація стосується інформації щодо безпеки лікарського засобу, яка на даний момент відсутня і має бути зібрана (наприклад, щодо довгострокового застосування препарату).

Важливі ідентифіковані ризики	1. Гіперчутливість 2. Порушення з боку кишечника: кишкова кровотеча
Важливі потенційні ризики	- -
Відсутня інформація	- -

II.V Резюме важливих ризиків

Інформація з безпеки у запропонованій інформації про лікарський засіб відповідає інформації референтного лікарського засобу.

II.C Післяреєстраційний план розробки

II.C.1 Дослідження, проведення яких є умовою, визначеною у реєстраційному посвідченні

Досліджень, проведення яких є умовою, визначеною у реєстраційному посвідченні, або спеціальним зобов'язанням щодо препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг, немає.

II.C.2 Інші дослідження у післяреєстраційному плані розробки

Немає таких досліджень щодо препарату Гліцеринові супозиторії для дітей, супозиторії ректальні по 1405 мг, проведення яких би вимагалось.