

ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Пам'ятка для пацієнтів

Хайрімос 40 адалімумаб

Інформація для Вас та медичного працівника, який бере участь у наданні Вам медичній допомозі чи лікування.

У цій пам'ятці вказані не всі можливі побічні ефекти. **Уважно прочитайте інструкцію-вкладиш препарату Хайрімос 40 або зверніться до свого лікаря за додатковою інформацією про побічні ефекти**

Ця пам'ятка містить важливу інформацію з безпеки, яку потрібно знати до та під час лікування препаратом Хайрімос 40

- Зберігайте цю пам'ятку під час лікування та протягом 70 днів після останньої ін'єкції засобу Хайрімос 40
- Покажіть цю пам'ятку будь-якому лікареві або медичному працівнику, який залучений до Вашого лікування
- Запишіть інформацію про свої аналізи на туберкульоз (ТБ) або лікування ТБ на звороті цієї пам'ятки

Вступ

Хайрімос 40 – це лікарський засіб, призначений для лікування захворювань, які вражають певну частину імунної системи. Хоча Хайрімос 40 ефективний у лікуванні цих захворювань, у деяких людей можуть розвинути один чи кілька побічних ефектів. Слід обговорити з Вашим лікарем можливі переваги та побічні ефекти застосування засобу Хайрімос. У різних людей вони можуть розрізнятися.

- Мета цієї пам'ятки – розповісти про деякі можливі побічні ефекти препарату Хайрімос 40
- Деякі з серйозних побічних ефектів, які можуть виникнути, включають інфекції, рак та порушення з боку нервової системи
- Це не усі можливі побічні ефекти препарату Хайрімос 40

До початку лікування препаратом Хайрімос 40

Повідомте лікаря про свої проблеми зі здоров'ям та про будь-які лікарські засоби, які Ви отримує. Це допоможе Вам і лікарю вирішити, чи підходить Вам лікування препаратом Хайрімос 40.

Повідомте лікаря, якщо Ви:

- Маєте інфекцію або симптоми будь-якої інфекції (такі як гарячка, рани, відчуття втоми, стоматологічні проблеми)
- Страждаєте на туберкульоз або були у тісному контакті з людиною із туберкульозом
- Маєте чи мали рак
- Відчуваєте оніміння або поколювання або маєте порушення з боку нервової системи, наприклад, розсіяний склероз

Перед призначенням препарату Хайрімос 40 лікар повинен оглянути Вас на наявність ознак та симптомів туберкульозу. Ви можете потребувати терапії з приводу туберкульозу до того, як розпочнеться лікування препаратом Хайрімос 40.

Вакцинація

- Ви можете отримати будь-яку вакцину, окрім живих вакцин.
- Якщо ви отримуєте препарат Хайрімос 40 у період вагітності, необхідно повідомити про це лікаря, перш ніж дитина отримає вакцину. Вашої дитині не рекомендується застосування «живої вакцини», такої як БЦЖ (для профілактики туберкульозу), протягом 5 місяців після останньої дози препарату Хайрімос 40 отриманої Вами під час вагітності.

Під час лікування препаратом Хайрімос 40

Щоб переконатися, що Хайрімос 40 працює належним чином і безпечний для Вас, слід регулярно обговорювати Ваш стан з лікарем. Негайно повідомляйте лікаря про будь-які зміни у своєму стані.

Постійно інформуйте лікаря про вплив препарату Хайрімос 40 на Ваш стан

- Необхідно негайно звернутись до лікаря у разі виникнення будь-яких незвичайних симптомів. Це допоможе переконатися, що Ви отримуєте належне лікування, і також знизить ймовірність погіршення стану у разі побічного ефекту
- У разі негайного звернення до лікаря більшість побічних ефектів, включаючи інфекції, можуть бути зворотними
- Якщо у Вас виникає побічний ефект, лікар вирішить, чи слід продовжити або припинити лікування препаратом Хайрімос 40. Необхідно обговорити з лікарем, який варіант підходить саме для Вас
- Оскільки побічні ефекти можуть розвинути після останньої дози препарату Хайрімос 40, необхідно повідомити лікаря про будь-які проблеми, які можуть виникнути у Вас у період до 70 днів після останньої ін'єкції препарату Хайрімос 40.

Повідомте лікаря про:

- Будь-які нові захворювання
- Нові лікарські засоби, які Ви приймаєте
- Будь-яке заплановане хірургічне втручання або операції

У деяких людей, які лікуються препаратом Хайрімос 40, можуть виникнути серйозні побічні ефекти, включаючи:

Інфекції

Препарат Хайрімос 40 допомагає людям з певними запальними захворюваннями. Механізм його дії полягає у блокуванні частини імунної системи. Однак ця частина імунної системи також допомагає боротися з інфекцією. Це означає, що Хайрімос 40 може збільшити ймовірність розвитку інфекції або погіршити перебіг наявної інфекції. Сюди відносяться такі інфекції, як застуда, або серйозніші інфекції, такі як туберкульоз

Рак

Якщо Ви отримуєте препарат Хайрімос 40, ризик розвитку певних видів раку може зрости

Порушення з боку нервової системи

Під час лікування препаратом Хайрімос у деяких людей можуть розвинути нові порушення з боку нервової системи чи загостритись наявні порушення, такі як розсіяний склероз

У цій пам'ятці вказані не всі побічні ефекти, які можуть виникнути під час лікування препаратом Хайрімос 40. Уважно прочитайте інструкцію-вкладиш препарату Хайрімос 40 для отримання додаткової інформації.

Зателефонуйте до лікаря або одразу зверніться за медичною допомогою, якщо у Вас виникнуть будь-які з нижчезазначених симптомів можливих серйозних побічних ефектів:

Інфекції

- Гарячка, озноб, незвичайне потовиділення, погане самопочуття або підвищена втомлюваність, відчуття нездужання або нездужання (наприклад, нудота або блювання), діарея, біль у шлунку, втрата апетиту або зменшення маси тіла, кашель або харкання кров'ю чи слизом, задишка, проблеми з сечовипусканням, шкірні виразки, рани, біль у м'язах, стоматологічні проблеми

Рак

- Нічна пітливість, набряк лімфатичних вузлів (набряклі залози) в області шиї, пахв, паху чи інших областей, зменшення маси тіла, нові ураження шкіри або зміна наявних шкірних уражень (таких як родимки або веснянки), сильний свербіж неясного походження

Порушення з боку нервової системи

- Оніміння або поколювання, зміни зору, м'язова слабкість, запаморочення неясного походження

Повідомте лікаря про будь-які незвичні симптоми, які виникнуть у Вас під час лікування препаратом Хайрімос 40. У цій пам'ятці вказані не всі можливі симптоми цих побічних ефектів.

Інформація для Вас та медичних працівників, які беруть участь у наданні Вам медичної допомоги чи лікування

Тестування та лікування туберкульозу (ТБ)

Поставте галочку, якщо Ви коли-небудь проходили тестування на наявність ТБ:

ТАК (зверніться до лікаря, якщо не знаєте)

Поставте галочку, якщо результат будь-якого з Ваших тестів на ТБ був позитивним:

ТАК (зверніться до лікаря, якщо не знаєте)

Поставте галочку, якщо Ви колись приймали таблетки для лікування ТБ:

ТАК (зверніться до лікаря, якщо не знаєте)

Для отримання більш детальної інформації стосовно препарату Хайрімос 40 прочитайте інструкцію-вкладиш. Якщо у Вас залишились питання, зверніться до свого лікаря або іншого медичного працівника.

Ваше ім'я:

Ім'я вашого лікаря (який призначив препарат Хайрімос 40):

Тел. Вашого лікаря:

Показання до застосування:

Дата першої ін'єкції Вам препарату Хайрімос 40:

Доза препарату Хайрімос 40 для Вас:

Дата останньої ін'єкції препарату Хайрімос 40 для Вас
(якщо ви більше не отримує препарат Хайрімос 40):

Заповніть інформацію для себе та медичних працівників, які беруть участь у наданні Вам медичної допомоги чи лікування.

РП № UA/17973/01/01

Лікарські засоби мають протипоказання та можуть викликати побічні реакції.

Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватись з лікарем та обов'язково ознайомитися з Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.

Ви можете повідомити про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу Державний експертний центр МОЗ України за телефоном +38 044 202 17 00 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку), або за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>, а також Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандоз Україна» за телефоном, електронною адресою, або за допомогою сайту: +38 044 389 39 30 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку), drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua