

Для пацієнтів, що застосовують препарат

ФАВІПІРАВІР-МІКРОХІМ

ФАВІПІРАВІР-МІКРОХІМ застосовується для лікування нових або повторних пандемічних інфекцій, спричинених вірусом грипу, при яких лікування іншими протівірусними засобами було неефективним або недостатньо ефективним.

В експериментальних дослідженнях на тваринах було підтверджено, що фавіпіравір, який є діючою речовиною лікарського засобу ФАВІПІРАВІР-МІКРОХІМ, спричиняє вади у розвитку плода, смерть ембріона та/або мав тератогенний вплив на плід.

Відомо, що фавіпіравір потрапляє у грудне молоко та сперму. З цих причин необхідно припинити грудне вигодовування та використовувати найбільш ефективні методи контрацепції.

Як застосовувати препарат

- По 8 таблеток (1600 мг) перорально 2 рази на день у 1-й день, потім по 3 таблетки (600 мг) перорально 2 рази на день протягом наступних 4-х днів.
- У випадку пропущеного прийому препарату, необхідно прийняти 1 дозу препарату одразу, як тільки було підмічено, що вона пропущена. Але, якщо за часом треба приймати наступну дозу препарату, то необхідно пропустити прийом цієї дози та прийняти наступну за часом дозу препарату. Не можна застосовувати 2 дози препарату за один прийом.
- У випадку застосування великої кількості препарату або у випадку виникнення побічних реакцій з боку препарату необхідно негайно звернутися до лікаря.
- У разі залишку зайвого неприйнятого препарату, не можна застосовувати його пізніше, ділитися ним зі своєю родиною або передавати іншим людям. У разі залишку препарату необхідно проконсультуватися з лікарем щодо можливості повернення зайвого препарату.

Період вагітності та годування груддю

Застосування фавіпіравіру у період вагітності може спровокувати вади у розвитку плода, а також ранню ембріональну смерть. Окрім того фавіпіравір проникає у грудне молоко та сперму, тому при його застосуванні необхідно дотримуватися наступних заходів безпеки.

Жінкам:

- Препарат протипоказано застосовувати у період вагітності або при підозрі вагітності.
- Під час лікування цим препаратом та протягом 7 днів після закінчення його застосування з метою запобігання вагітності у разі можливих статевих відносин Вам та вашому партнеру необхідно використовувати найефективніші методи контрацепції, включаючи презервативи.
- При застосуванні препарату у період годування груддю необхідно припинити грудне вигодовування, оскільки фавіпіравір проникає у грудне молоко.
- Якщо є підозра вагітності протягом періоду лікування препаратом або протягом 7 днів після закінчення лікування, необхідно припинити застосування препарату та негайно звернутися до лікаря.

Чоловікам:

- Фавіпіравір проникає у сперму, тому необхідно обов'язково використовувати презерватив з метою контрацепції у період лікування препаратом та протягом 7 днів після закінчення лікування.
- Не рекомендується вступати у статеві відносини з вагітними жінками у період лікування препаратом та протягом 7 днів після закінчення лікування з метою уникнення можливого негативного впливу на плід.
- Якщо під час лікування та протягом 7 днів після закінчення лікування виникає підозра вагітності, необхідно негайно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

***У разі виникнення побічних реакцій з боку лікарського засобу або будь-яких питань щодо його застосування необхідно проконсультуватися з лікарем.**

Контактна інформація для лікарів

Повідомлення про випадки побічних реакцій

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу є важливими. Вони дозволяють проводити безперервний моніторинг співвідношення користь/ризик щодо застосування препарату.

Просимо Вас повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції до:

- ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»: вул. Антона Цедіка 14, м. Київ, 03057. Електронна форма карти-повідомлення знаходиться за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>;
- ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» за тел. **+38 (050) 309-83-54** або на електронну адресу zhurba@microkhim.com. Електронна форма карти-повідомлення знаходиться на сайті компанії ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» за посиланням <https://microkhim.com.ua/farmakonaglyad/>

af Bogh