

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗА НИМИ ДОГЛЯДАЮТЬ

ЦЕ КЕРІВНИЦТВО МАЄ ЛИШЕ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР. ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ СОЛІКВА ВИ ПОВИННІ ПРОЙТИ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ШПРИЦ-РУЧКИ СОЛІКВА У МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА, А ТАКОЖ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ.


Зберігайте цю картку. Вам може знадобитися переглянути її ще раз.
Напишіть своє ім'я на цій картці: _____

Шприц-ручку СОЛІКВА використовують для того, щоб одночасно вводити інсулін гларгін і ліксисенатид шляхом однієї ін'єкції один раз на добу.

СОЛІКВА випускається у двох попередньо заповнених шприц-ручках, кожна з яких містить ліксисенатид в 2 різних концентраціях та інсулін гларгін 100 Од./мл з різними діапазонами доз. Ваш лікар призначив вам шприц-ручку відповідно до вашої потреби в інсуліні.

ШПРИЦ-РУЧКА СОЛІКВА 10–40

СОЛІКВА 100 Од./мл + 50 мкг/мл
РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ В ПОПЕРЕДНЬО ЗАПОВНЕНІЙ ШПРИЦ-РУЧЦІ



ШПРИЦ-РУЧКА СОЛІКВА 30–60

СОЛІКВА 100 Од./мл + 33 мкг/мл
РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ В ПОПЕРЕДНЬО ЗАПОВНЕНІЙ ШПРИЦ-РУЧЦІ



- Обидві попередньо заповнені шприц-ручки містять інсулін гларгін в концентрації 100 Од./мл.
- Шприц-ручку СОЛІКВА (10–40) потрібно використовувати для щоденних ін'єкцій в діапазоні 10–40 поділок шкали (дозування: інсулін гларгін 100 Од./мл і ліксисенатид 50 мкг/мл; діапазон доз: від 10 до 40 одиниць інсуліну гларгіну в поєднанні з 5–20 мкг ліксисенатиду). Ця шприц-ручка персикового кольору з оранжевою кнопкою для введення.
- Шприц-ручку СОЛІКВА (30–60) потрібно використовувати для щоденних ін'єкцій в діапазоні 30–60 поділок шкали (дозування: інсулін гларгін 100 Од./мл і ліксисенатид 33 мкг/мл; діапазон доз: від 30 до 60 одиниць інсуліну гларгіну в поєднанні з 10–20 мкг ліксисенатиду). Ця шприц-ручка оливкового кольору з коричневою кнопкою для введення.
- Одна поділка шкали містить одну одиницю інсуліну гларгіну в концентрації 100 Од./мл плюс відповідну кількість ліксисенатиду. Перш ніж використовувати лікарський засіб СОЛІКВА, уточніть скільки поділок шкали вам потрібно. Цю інформацію вам надає ваш лікар.
- Показчик дози попередньо заповненої шприц-ручки вказує на кількість поділок шкали, які потрібно ввести.
- У рецепті має бути вказано, який тип попередньо заповненої шприц-ручки вам потрібен (шприц-ручка СОЛІКВА [10–40] або шприц-ручка СОЛІКВА [30–60]) та кількість поділок шкали, які потрібно ввести.
- Вашому фармацевтичному працівнику також потрібно уточнити у лікаря, який призначає лікарський засіб, інформацію відсутню у рецептах, що заповнені не повністю.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЗА НИМИ ДОГЛЯДАЮТЬ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

- Лікарський засіб СОЛІКВА випускається в попередньо заповненій шприц-ручці і повинен використовуватися тільки з цим пристроєм. Пацієнти, особи, які за ними доглядають, і медичні працівники ніколи не повинні використовувати шприц, щоб набрати СОЛІКВА з попередньо заповненої шприц-ручки, аби уникнути помилок у дозуванні та завдання серйозної шкоди в результаті. Перед кожною ін'єкцією потрібно завжди під'єднувати нову голку. Голки не можна використовувати повторно.
- В СОЛІКВА одна поділка шкали завжди містить одну одиницю інсуліну гларгіну в концентрації 100 Од./мл, незалежно від того, яку попередньо заповнену шприц-ручку СОЛІКВА ви використовуєте (шприц-ручку СОЛІКВА [10–40] або шприц-ручку СОЛІКВА [30–60]).
- Ваш лікар надасть роз'яснення щодо дизайну та особливостей вашої шприц-ручки СОЛІКВА, зокрема те, як показчик дози попередньо заповненої шприц-ручки вказує на кількість поділок шкали, які потрібно ввести.
- При переході на цей тип комбінованих лікарських засобів та протягом декількох тижнів після цього потрібно частіше вимірювати рівень цукру в крові.
- Якщо у вас виникли питання щодо лікування, зверніться до свого лікаря.

ПЕРЕД ВВЕДЕННЯМ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ СОЛІКВА



Уважно прочитайте Інструкцію для медичного застосування, яка міститься в упаковці лікарського засобу.



Якщо ви не будете дотримуватися всіх цих інструкцій, ви можете отримати зовелику або замалу дозу лікарського засобу.

Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, повідомте про це лікаря або фармацевтичного працівника. Це також стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не зазначених в Інструкції для медичного застосування. Ви також можете повідомляти про помилки прийому лікарського засобу або побічні реакції, виникнення яких потенційно може бути пов'язане з застосуванням шприц-ручки СОЛІКВА до підрозділу фармаконагляду ТОВ «Санofi-Авентіс Україна» за адресою Pharmacovigilance-UA@sanofi.com.

Якщо у Вас виникли будь-які питання або необхідна додаткова інформація, будь ласка, звертайтеся у службу з питань забезпечення медичною інформацією у ТОВ «Санofi-Авентіс Україна»: Тел: +380 44 354 20 00; e-mail: Medinfo.Ukraine@sanofi.com.