

Червень 2022

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

## **Пам'ятка для пацієнта, якому призначили лікарський засіб Фероксид, розчин для ін'єкцій, по 20 мг/мл**

Шановний пацієнте! Будь-ласка, прочитайте уважно цю пам'ятку та при появі запитань задайте їх лікарю.

### **Показання до призначення заліза для внутрішньовенного введення:**

Дефіцит заліза у пацієнтів, яким не можуть бути призначені пероральні лікарські засоби, що містять залізо, або у разі їх неефективності або неможливості перорального прийому лікарських засобів, що містять залізо, у таких випадках:

- непереносимість пероральних лікарських засобів, що містять залізо;
- наявність запальних захворювань шлунково-кишкового тракту (наприклад виразкового коліту), які можуть загострюватися при терапії пероральними лікарськими засобами, що містять залізо;
- залізодефіцитні стани, резистентні до терапії, у випадку, коли контроль цих станів пероральними лікарськими засобами, що містять залізо, недостатній.

При дотриманні рекомендацій, що вказані в інструкції для медичного застосування [<http://www.drlz.com.ua>], внутрішньовенні лікарські засоби, що містять залізо, досить безпечні. Однак відомо, що кожний лікарський засіб може мати побічну дію. Зокрема, при застосуванні Фероксиду можуть розвинути важкі алергічні реакції (анафілактичний шок/анафілактоїдні реакції). Повідомляли про виникнення таких реакцій навіть у випадках, коли попереднє застосування внутрішньовенних форм заліза проходило без ускладнень.

Якщо Вам призначено Фероксид, з метою підвищення Вашої безпеки, обов'язково повідомте лікаря про наявність:

- підвищеної чутливості до гідроксид сахарозного комплексу або інших внутрішньовенних форм заліза;
- алергічних реакцій на інші лікарські засоби;
- імунологічних чи запальних захворювань (наприклад, системного червоного вовчака, ревматоїдного артрити);
- бронхіальної астми тяжкого ступеня, екземи або інших atopічних алергічних реакцій;
- вагітності.

Також хочемо повідомити Вам додаткову інформацію про процедуру введення Фероксиду:

- перед призначенням лікар має проінформувати Вас про ризики, які пов'язані із застосуванням внутрішньовенних форм заліза;
- лікарський засіб вводять лише при наявності кваліфікованого персоналу, який може надати невідкладну допомогу у випадку розвитку анафілактичної реакції;
- після кожного застосування лікарського засобу, Ви повинні знаходитись під ретельним наглядом медичного персоналу принаймні 30 хвилин;
- якщо Ви вагітні, лікар призначає лікування тільки у випадку якщо потенційна користь від застосування переважає над ризиком.

***Інформація щодо повідомлення про побічні реакції:***

Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за № 1649/29779 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 вересня 2016 року № 996) слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України заповнивши карту-повідомлення за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua/>.

Також, про виникнення побічних реакцій при застосуванні лікарського засобу Фероксид просимо повідомити компанію «М. Біотек Лімітед»:

- за адресою: м. Київ, вул. Костьольна, 3 оф. 7, тел (044) 228-37-89 або за електронною адресою: [info@mbiotech.com.ua](mailto:info@mbiotech.com.ua).
- заповнивши форму на сайті [www.mbiotechltd.com](http://www.mbiotechltd.com).