

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА

КСЕЛЬЯНЗ (тофацитиніб) ▼ ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА

▼ Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу. Обов'язково повідомте свого лікаря у разі виникнення будь-яких побічних реакцій під час лікування Ксельянзом. Також Ви можете повідомити про побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua/>.

Пам'ятку для пацієнта розміщено на веб-сайті [Pfizermed.com.ua](https://www.pfizermed.com.ua) та за посиланням <https://www.pfizer.ua/2216>.

- Ця Пам'ятка містить важливу інформацію про безпеку, з якою Ви повинні бути ознайомленими перед початком застосування та протягом лікування лікарським засобом Ксельянз. Якщо Ви не розумієте цієї інформації, будь ласка, попросіть свого лікаря пояснити її Вам.
- Носіть цю картку із собою та показуйте її лікарям та фармацевтам, які надають Вам допомогу.
- Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції для медичного застосування лікарського засобу Ксельянз. Лікарський засіб Ксельянз слід застосовувати згідно з рекомендаціями інструкції для медичного застосування.

Розкажіть своєму лікарю про ВСІ лікарські засоби, які Ви застосовуєте, в тому числі рецептурні та безрецептурні, вітаміни та біодобавки.

Деякі ліки не слід застосовувати разом з препаратом Ксельянз, оскільки вони можуть змінити рівень лікарського засобу у вашому організмі, і призначена Вам доза може потребувати коригування. Слід обов'язково повідомити лікаря, якщо ви приймаєте ліки, які містять такі активні речовини:

- антибіотики, такі як рифампіцин, що застосовуються для лікування бактеріальних інфекцій;
- флуконазол та кетоконазол, що застосовуються для лікування грибкових інфекцій.

Слід обов'язково повідомити лікаря, якщо ви хворієте на цукровий діабет.

Лікарський засіб Ксельянз не слід одночасно застосовувати з біологічними базисними протиревматичними препаратами для лікування ревматоїдного артрити або з деякими іншими лікарськими засобами, що пригнічують імунну систему (наприклад, азатіоприн, меркаптопурин, такролімус або циклоспорин). Одночасний прийом препарату Ксельянз з цими лікарськими засобами може збільшити ризик імуносупресії та виникнення інфекції.

Ксельянз може збільшити ризик виникнення інфекції, яка може стати тяжкою, якщо її не лікувати. У разі, якщо Вам 65 років або більше, Ви хворієте на діабет або маєте хронічні захворювання легень, або приймаєте кортикостероїди, можливий високий ризик розвитку інфекції. Ваше лікування препаратом Ксельянз може бути припинено лікарем. Лікування лікарським засобом Ксельянз може збільшити ризик виникнення немеланомного раку шкіри

Інша інформація (будь ласка, заповніть)

Повне ім'я пацієнта:

Повне ім'я лікаря:

Телефон лікаря:

Факс або електронна пошта лікаря:

Якщо ви припините приймати Ксельянз, носіть цю картку з собою принаймні протягом 2 місяців після прийому останньої дози лікарського засобу.

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

Під час лікування лікарським засобом КСЕЛ'ЯНЗ

Негайно розкажіть своєму лікарю, якщо :

- виникає раптова задишка або утруднене дихання, біль у грудях або біль у верхній частині спини, набряк ніг або рук, біль або слабкість у ногах, або почервоніння чи зміна кольору ніг або рук при застосуванні лікарського засобу Ксель'янз, оскільки це можуть бути ознаки згустку в легенях або венах.
- у Вас виникають симптоми інфекції, такі як лихоманка, постійний кашель, втрата ваги або надмірна втома.
- у Вас виникають симптоми оперізуючого лишая, такі як болючі висипання на шкірі або пухирі.
- Ви близько контактували з людиною, хворою на туберкульоз.
- Ви помітили будь-який новий нарост на шкірі або зміни наявних родимок або плям.
- у Вас виникають симптоми інтерстиціальної хвороби легень, такі як задишка.
- у Вас виникають ознаки та симптоми, пов'язані зі шлунково-кишковим трактом, такі як біль у шлунку, біль у животі, кров у калі чи будь-які зміни у випорожненнях, що супроводжуються підвищенням температури.
- у Вас виникають жовтяниця, нудота або блювання.
- Ви маєте отримати щеплення. Під час прийому лікарського засобу Ксель'янз не слід вакцинуватися певними типами вакцин.
- Ви вагітні або маєте намір завагітніти. Лікарський засіб Ксель'янз не можна використовувати під час вагітності. Жінки дітородного віку повинні використовувати ефективні методи контрацепції під час терапії та протягом щонайменше 4 тижнів після прийому останньої дози лікарського засобу Ксель'янз.
- Жінки не повинні годувати груддю під час лікування лікарським засобом Ксель'янз.