

## КАРТКА-ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТА

**Постійно носіть цю картку-пам'ятку із собою та показуйте її всім медичним працівникам для інформування, що Ви отримували лікування препаратом ЛЕМТРАДА.**

Я отримую лікування препаратом ЛЕМТРАДА проти розсіяного склерозу (РС), який впливає на імунну систему. Я беру участь у спеціальній програмі моніторингу, в рамках якої контроль здійснюється щомісяця протягом 4 років після останнього курсу лікування.

**Застосування препарату ЛЕМТРАДА може підвищити ризик виникнення:**

- Тяжких інфекційних захворювань
- Серйозних побічних реакцій, які пов'язані із застосуванням препарату ЛЕМТРАДА та збігаються в часі з його інфузією, таких як: серцевий напад, інсульт, розриви в кровоносних судинах, які живлять мозок, кровотеча в легенях і тромбоцитопенія
- Відстрочених побічних реакцій, таких як: порушення функції щитовидної залози, ІТП, порушення функції нирок, аутоімунний гепатит, ГЛГ і набута гемофілія

**Лікарі: Більш докладну інформацію див. в інструкції для медичного застосування лікарського засобу ЛЕМТРАДА**

З невропатологом, який призначив мені препарат ЛЕМТРАДА, можна зв'язатися за телефоном чи електронною поштою, наведеними нижче. Можуть бути зазначені також лікарі або інші медичні працівники, залучені до мого лікування.

При проведенні будь-яких медичних обстежень передайте копії усіх медичних документів, включно з призначенням лікарських засобів та/або результати аналізів, лікарю(-ям) та медсестрі(-ам), зазначеним нижче.

ПІБ пацієнта: .....

Підпис пацієнта: .....

Дата останньої інфузії препарату Лемтрада: .....

	ПІБ	Номер телефону	Email
Невропатолог			
Лікар загальної практики			
Медична сестра-спеціаліст із розсіяного склерозу			

**Дуже важливо, щоб Ви продовжували щомісяця здавати аналізи протягом останніх 48 місяців (4 років) після останньої інфузії (навіть якщо Ви добре себе почуваєте).**

Відстрочені побічні реакції можуть виникати і після 48 місяців. Таким чином, Ви повинні продовжувати слідкувати за ознаками й симптомами навіть тоді, коли потреба в проведенні щомісячних аналізів зникне.<sup>1</sup>



**Виявлення та діагностування захворювань на ранньому етапі забезпечує найкращі результати лікування.**



**Ви також маєте й надалі звертати увагу на відповідні ознаки та симптоми.**



**Це необхідно робити протягом 4 років після останнього курсу лікування препаратом ЛЕМТРАДА.**

## Що Ви маєте знати про препарат ЛЕМТРАДА (алемтузумаб)

Одразу зателефонуйте своєму невропатологу, якщо у Вас з'явилися вперше, посилилися або повторно виникли вказані нижче симптоми. Якщо Ви не можете зв'язатися зі своїм лікарем, зверніться за невідкладною медичною допомогою. Покажіть медичним працівникам цю картку.

### ВАЖЛИВІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ, ЗА ЯКИМИ НЕОБХІДНО СЛІДКУВАТИ:

#### Тяжкі інфекційні захворювання

Гарячка та/або озноб, втомлюваність, погане самопочуття

Задишка, кашель, дихання з хрипом або свистом, біль або відчуття тиску в грудях, кровохаркання

Рідкісна інфекція мозку, яка називається ПМЛ (прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія)

- Прогресуюча слабкість або важкість у кінцівках
- Розлад зору, проблеми з мовленням
- Зміни мислення, пам'яті та орієнтації, які призводять до сплутаності свідомості або змін особистості

#### Серйозні побічні реакції, які пов'язані із застосуванням препарату ЛЕМТРАДА та збігаються в часі з його інфузією

(побічні реакції, які зазвичай виникають протягом 1–3 днів після інфузії)

##### Серцевий напад

- Біль або дискомфорт у грудях, задуха, біль або дискомфорт у руках, щелепі, шиї, спині або животі
- Відчуття запаморочення або слабкості, нудота, потовиділення

##### Інсульт і розрив у кровоносних судинах, які живлять мозок

- Раптовий парез частини обличчя, слабкість з однієї сторони тіла, проблеми з мовленням
- Раптовий сильний головний біль, біль у шиї

##### Легенева кровотеча

- Задуха, біль або дискомфорт у грудях, кашель із кров'ю

##### Тромбоцитопенія

- Легке утворення синців та/або кровотечі

#### Відстрочені побічні реакції (можуть виникати через кілька місяців або років після інфузії)

##### Порушення з боку щитовидної залози

- Надмірне потовиділення, незрозуміла втрата або набір маси тіла, набряки навколо очей, нервовість, швидке серцебиття
- Відчуття холоду, втомлюваність, що посилюється, або поява закрепу

##### Імунна тромбоцитопенічна пурпура (ІТП)

- Невеликі спорадичні цятки червоного, рожевого або пурпурного кольору на шкірі, схильність до утворення синців, кровотеча при порізі, яку складніше зупинити, ніж зазвичай, більш інтенсивні, тривалі або часті менструації, ніж зазвичай
- Кровоточивість ясен або кровотечі з носу, яких раніше не було або які складніше зупинити, ніж зазвичай, кровохаркання
- Біль або набряк суглобів

#### Порушення функції нирок, включаючи захворювання з утворенням антитіл до базальної мембрани клубочків (анти-БМК-хвороба)

- Сеча з домішками крові, яка може мати червоний колір або колір чаю, набряк ніг або стоп

##### Аутоімунний гепатит

- Незрозуміла нудота, блювання, втомлюваність, біль у животі, втрата апетиту, набряк у животі
- Пожовтіння шкіри і очей та/або темна сеча, кровотеча або більш легке утворення синців, ніж зазвичай

##### Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз (ГЛГ)

- Незрозуміло висока температура, сильний головний біль, скутість потиличних м'язів, збільшені лімфовузли, жовта шкіра, висип на шкірі

##### Набута гемофілія

- Кровотеча з порізів, яку довше зупиняти, ніж зазвичай
- Раптова поява синців, носова кровотеча, біль або набряк суглобів