

ПІБ лікаря:

Номер телефону:

Примітки:

Таблиця відвідувань

Будь ласка, використовуйте цю таблицю для запису дат відвідувань Вашого лікаря:

Дата відвідування	Вид контрацепції	Результат тесту на вагітність	Підпис лікаря
		<input type="checkbox"/> позитивний <input type="checkbox"/> негативний Дата:	
		<input type="checkbox"/> позитивний <input type="checkbox"/> негативний Дата:	
		<input type="checkbox"/> позитивний <input type="checkbox"/> негативний Дата:	
		<input type="checkbox"/> позитивний <input type="checkbox"/> негативний Дата:	
		<input type="checkbox"/> позитивний <input type="checkbox"/> негативний Дата:	
		<input type="checkbox"/> позитивний <input type="checkbox"/> негативний Дата:	
		<input type="checkbox"/> позитивний <input type="checkbox"/> негативний Дата:	
		<input type="checkbox"/> позитивний <input type="checkbox"/> негативний Дата:	



Картка-пам'ятка для пацієнта для лікарського засобу Роаккутан®

▼ Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу. Це дозволить швидко ідентифікувати нову інформацію з безпеки.

Просимо повідомляти про будь-які побічні реакції, у тому числі про випадки впливу лікарського засобу Роаккутан® на плід під час вагітності (незалежно від результату) за електронною адресою ukraine.safety@roche.com або за телефонами +38 (044) 29 888 33; 0 (800) 501 501, або звернувшись до офісу компанії: ТОВ «Рош Україна», вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх, м. Київ, 03150

Про побічні реакції слід також повідомити Державний експертний центр МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>

Дані матеріали є навчальними та не розповсюджуються з метою реклами

Роаккутан®
Ізотретиноїн

Роаккутан® не можна застосовувати під час вагітності.

Якщо вагітна жінка приймає Роаккутан®, він може завдати серйозної шкоди ненародженій дитині.

Якщо Ви завагітніли або вважаєте, що можете бути вагітною, негайно припиніть прийом лікарського засобу Роаккутан® та зверніться до Вашого лікаря.

Уважно прочитайте інструкцію для медичного застосування ЛЗ Роаккутан® перед початком лікування за адресою www.drlz.com.ua.

Якщо у Вас є будь-які питання або сумніви щодо прийому лікарського засобу Роаккутан®, зверніться до Вашого лікаря.

Що Вам необхідно робити, щоб уникнути вагітності:

- ❗ Вам необхідно використовувати щонайменше 1 високоефективний метод контрацепції (такий як внутрішньоматковий контрацептив (ВМК) або імплантат) або правильно використовувати 2 ефективних протизаплідних методи, які діють різними способами (наприклад оральний контрацептив разом з презервативом), до, під час та протягом 1 місяця після припинення лікування.

- ❗ **Вам не можна вагітніти під час прийому лікарського засобу Роаккутан® і протягом 1 місяця після припинення лікування.**

- ❗ **Вам необхідно регулярно відвідувати лікаря та регулярно проводити тест на вагітність:**

- Перед початком лікування Вам необхідно провести тест на вагітність, який повинен бути негативним.
- Для того, щоб переконатися, що Ви не вагітні під час лікування, Вам слід регулярно проводити тести на вагітність, щонайменше, кожного місяця. Вам слід також провести заключний тест на вагітність через 1 місяць після припинення терапії.

Пам'ятка для чоловіків та жінок

Цей лікарський засіб

призначений саме для Вас.

Не передавайте його іншим особам, це може завдати їм шкоди.

Картка-пам'ятка для пацієнта

ПІБ лікаря:

.....
.....
.....
.....

Номер телефону:

.....
.....

Примітки:

.....
.....