

Списіб застосування та дози

- Ампула об'ємом 10 мл призначена тільки для доношених новонароджених, немовлят та дітей з масою тіла до 10 кг.
- Флакон об'ємом 50 мл призначений лише для дітей з масою тіла більше ніж 10 кг і до 33 кг.
- Флакон об'ємом 100 мл призначений лише для дорослих та дітей з масою тіла більше 33 кг.

1 Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл за посиланням www.dhtz.com.ua

Інструкція з використання

- Калькулятор дозування вивачення для вибраної маси тіла правильної дози вивачення
- Масу тіла можна вбрати в діапазоні від 3 кг до 10 кг з кроком 1 кг, від 10 до 50 кг з кроком 5 кг. У дітей з масою тіла ≤ 10 кг, об'єм, який необхідно ввести, потрібно вилити з ампули та розвести у розчині натрію хлориду 0,9% або у розчині глюкози 5%, або у комбінації обох розчинів до 1/10 парацетамолу (одна десята об'єму розчину лікарського засобу Парацетамол Б. Браун в дев'ять десятих розчинника) і вводити протягом 15 хвилин.

Парацетамол Б. Браун

розчин для інфузій, 10 мг/мл

КАЛЬКУЛЯТОР ДОЗ

3–50 кг



Міні-пласко® (Mini-Plasco) 10 мл:
1 мл = 10 мг
для пацієнтів з масою тіла ≤ 10 кг

Екофлак® плюс (Ecoflac plus) 50 мл:
1 мл = 10 мг
для пацієнтів з масою тіла > 10 ≤ 33 кг

Екофлак® плюс (Ecoflac plus) 100 мл:
1 мл = 10 мг
для пацієнтів з масою тіла > 33 кг

Маса тіла (кг)	Доза, що вводиться до 4 разів/добу	Максимальна доза/24 год	Розмір контейнера
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Маса тіла (кг)	Доза, що вводиться до 4 разів/добу	Максимальна доза/24 год	Розмір контейнера
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Компанія Б. Браун постачає лікарський засіб Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл у зручній для користувача упаковці Екофлак® плюс.

Готовий до застосування лікарський засіб по 50 мл та 100 мл особливо добре підходить для легкого застосування. Форма випуску по 10 мл в упаковці Міні-Пласко® полегшує титрування для дітей.

45	675 мг	2700 мг	100 мл	50	750 мг	3000 мг	100 мл
	67,5 мл	270 мл			75 мл	300 мл	
35	525 мг	2100 мг	100 мл	40	600 мг	2400 мг	100 мл
	52,5 мл	210 мл			60 мл	240 мл	
25	375 мг	1500 мг	50 мл	30	450 мг	1800 мг	50 мл
	37,5 мл	150 мл			45 мл	180 мл	
15	225 мг	900 мг	50 мл	20	300 мг	1200 мг	50 мл
	22,5 мл	90 мл			30 мл	120 мл	
9	67,5 мг	270 мг	10 мл	10	75 мг	300 мг	10 мл
	6,75 мл	27 мл			7,5 мл	30 мл	
7	52,5 мг	210 мг	10 мл	8	60 мг	240 мг	10 мл
	5,25 мл	21 мл			6,0 мл	24 мл	
5	37,5 мг	150 мг	10 мл	6	45 мг	180 мг	10 мл
	3,75 мл	15 мл			4,5 мл	18 мл	
3	22,5 мг	90 мг	10 мл	4	30 мг	120 мг	10 мл
	2,25 мл	9,0 мл			3,0 мл	12 мл	

Парацетамол Б. Браун розчин для інфузій, 10 мг/мл

СКЛАД

Розчин для інфузій містить:

1 мл	10 мг парацетамолу
В 1 ампулі об'ємом 10 мл	100 мг парацетамолу
В 1 флаконі об'ємом 50 мл	500 мг парацетамолу
В 1 флаконі об'ємом 100 мл	1000 мг парацетамолу

Допоміжні речовини:

Маніт, натрію цитрат дигідрат, оцтова кислота, льодяна (для коригування рН), вода для ін'єкцій.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Показання Для Застосування лікарського засобу Парацетамол Б. Браун:

- Короткочасне лікування помірного болю, особливо після операції.
- Короткочасне лікування гарячки.

Для введення внутрішньовенним способом клінічно обґрунтоване негайною потребою лікування болю або гіпертермії, та/або коли інші шляхи введення недоступні.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Гіперчутливість до парацетамолу, пропачетамолу гідрохлориду (попередника парацетамолу) або до будь-якої з допоміжних речовин. Випадки гепатоцелюлярної недостатності тяжкого ступеня.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Побічні реакції наведені за частотою:

Рідко:	($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1000$)
Дуже рідко	(< 1/10 000)
Невідомо	(неможливо оцінити з наявних даних)

З боку кровоносної та лімфатичної систем

Дуже рідко: Тромбоцитопенія, лейкопенія, нейтропенія

З боку імунної системи

Дуже рідко: Реакція гіперчутливості (1)

Кардіологічні порушення

Невідомо: Тахікардія (2)

З боку судинної системи

Рідко: Гіпотензія

Невідомо: Припливи (2)

З боку гепатобіліарної системи

Рідко: Підвищений рівень печінкових трансаміназ

З боку шкіри та підшкірної клітковини

Невідомо: Свербіж (2), еритема (2)

Загальні розлади та реакції у місці введення

Рідко: Слабкість

- (1) Повідомлялися про дуже рідкісні випадки реакції гіперчутливості від простих шкірних висипів або кропив'янки до анафілактичного шоку, які потребують припинення лікування.
- (2) Поодинокі випадки.

Під час клінічних випробувань часто повідомлялося про побічні реакції у місці ін'єкції (болі та відчуття печіння).

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

РИЗИК МЕДИЧНИХ ПОМИЛОК

Будьте обережні, щоб уникнути помилок у дозуванні через плутанину між міліграмом (мг) і мілілітром (мл), що може призвести до випадкового передозування та смерті.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Максимальна добова доза має бути скоригована для пацієнтів, які отримують інші лікарські засоби з вмістом парацетамолу.

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

Б. Браун Мельзунген АГ 34209 Мельзунген, Німеччина (B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen, Germany)

Остання редакція: 11.2015

Лише за рецептом.

Не всі лікарські форми лікарського засобу зареєстровані та схвалені для продажу у всіх країнах та регіонах.

Показання до застосування також можуть відрізнятися залежно від країни та регіону. Зверніться до представника вашої країни для отримання інформації про лікарський засіб та його наявність.