

Порівняльна картка для ЛЗ МАБТЕРА®

Даний матеріал має навчальний характер та не розповсюджується з метою реклами



Переконайтесь, що ви обрали правильну лікарську форму та дозування МАБТЕРА®

ДЛЯ ПІДШКІРНИХ ІН'ЄКЦІЙ

МАБТЕРА®, розчин для ін'єкцій, 1400 мг
Тільки для застосування при неходжкінській лімфомі



РОЖЕВА ВІДКИДНА КРИШКА

Набирати безпосередньо з флакона
та вводити шляхом підшкірної ін'єкції



ДЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННИХ ІНФУЗІЙ

МАБТЕРА®, концентрат для розчину для інфузій, 100 мг
МАБТЕРА®, концентрат для розчину для інфузій, 500 мг
Для застосування за всіма зареєстрованими показаннями
лікарського засобу МАБТЕРА®



Розводити 0,9 % розчином натрію хлориду
або 5 % розчином глюкози і вводити шляхом
внутрішньовенної інфузії



Перед застосуванням слід перевірити особливі характеристики упаковки лікарського засобу МАБТЕРА® для підшкірного введення:

Червоне маркування: «**тільки для підшкірного введення**»,
«**розчин для підшкірних ін'єкцій**» та «**підшкірно**»

Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом МОЗ України від 27 грудня 2006 року №898 (у редакції наказу МОЗ України від 26 вересня 2016 року №996) слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>

Також закликаємо повідомляти про усі підозрювані побічні реакції за електронною адресою ukraine.safety@roche.com або за телефоном +38 (044) 298 88 33, або звернувшись до офісу компанії:

ТОВ «Рош Україна», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх

Перед застосуванням, будь ласка, ознайомтесь з Інструкцією для медичного застосування МАБТЕРА®, що поставляється разом з лікарським засобом або за посиланням: <http://www.drlez.com.ua>

Опубліковано компанією ТОВ «Рош Україна» | версія 2.0.1