

Дата оприлюднення:
березень 2024

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою.

ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ:

ЛЕВОБАЦИД таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг.

ПОСІБНИК ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

щодо застосування лікарського засобу **ЛЕВОБАЦИД** (левофлораксин) та мінімізацію ризику виникнення аневризми та дисекції аорти та регургітації/недостатності серцевого клапана

ПРО ЩО ДАНИЙ ПОСІБНИК

В даному посібнику йдеться про ризики впливу левофлораксину на пацієнтів та шляхи зменшення цих ризиків. Якщо ви застосовуєте лікарський засіб **ЛЕВОБАЦИД**, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, або інші засоби, що містить левофлораксин, лікар проінформує Вас про ризик виникнення аневризми та дисекції аорти та/або регургітації, недостатності серцевого клапана. Лікар проконсультує Вас, а також відповість на будь-які питання, які у Вас можуть виникнути з приводу цієї теми. Цей посібник допоможе Вам запам'ятати інформацію, яку Ви обговорили з лікарем, тому Ви повинні зберегти даний посібник, щоб мати змогу знову звернутися до нього в будь-який час. Окрім ознайомлення з цим посібником, важливо також ознайомитись з інформацією про левофлораксин в інструкції для медичного застосування, яка поставляється у комплекті із лікарським засобом.

ЯКІ Є РИЗИКИ

Застосування левофлораксину може призвести до виникнення побічних реакцій, зокрема аневризми та дисекції аорти та/або регургітації або недостатності серцевого клапана. Левофлораксин слід застосовувати з обережністю пацієнтам похилого віку, пацієнтам з порушенням роботи серця та судин, а також пацієнтам, що мають аневризму та/або розшарування аорти (в анамнезі), пацієнтам з наявною артеріальною гіпертензією. Радимо обговорити ці питання з Вашим лікарем, щоб отримати більше порад та інформації.

ХТО ЗНАХОДИТЬСЯ В ГРУПІ РИЗИКУ

Наступні пацієнти повинні бути особливо обізнані про ризик впливу левофлораксину:

- Пацієнти, які одночасно отримують системні кортикостероїди;
- Пацієнти літнього віку;
- Пацієнти з порушеннями сполучної тканини (синдром Марфана або синдром Елерса-Данлоса, синдром Тернера, хвороба Бехчета, ревматоїдний артрит);
- Пацієнти з діагностованою аневризмою та/або розшаруванням аорти, а також з наявністю артеріальної гіпертензії.

Перед тим, як розпочати або продовжити прийом левофлораксину, лікар проінформує Вас про підвищений ризик виникнення аневризми та дисекції аорти та регургітації/недостатності серцевого клапана та шляхи їх уникнення. Це допоможе Вам, як пацієнту зрозуміти всі ризики. Ваш лікар також відповість на питання, які у Вас можуть виникнути з цієї теми.

ЯК УНИКНУТИ РИЗИКІВ

Якщо Ви не впевнені щодо будь-якої інформації в даному посібнику, будь ласка, обговоріть ці питання з Вашим лікарем.

Дуже важливо, щоб **Ви НЕ припиняли застосування левофлораксину**, не звернувшись до лікаря.

У разі виникнення невідкладних питань щодо ризику виникнення аневризми та дисекції аорти та регургітації/недостатності серцевого клапана при застосуванні лікарського засобу

Дата оприлюднення:
березень 2024

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою.

ЛЕВОБАЦИД, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг, будь ласка, зверніться до Вашого лікаря.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ ПАЦІЄНТІВ

Даний лікарський засіб призначений саме Вам.

Не передавайте його іншим особам. Це може завдати їм шкоди, навіть якщо їх симптоми однакові з Вашими.

Оскільки левофлоксацин підвищує ризик виникнення аневризми та дисекції аорти та регургітації/недостатності серцевого клапана, вам необхідно:

- Перед початком застосування левофлоксацину необхідно впевнитись, що у Вас немає діагностованої аневризми та/або розшарування аорти, відсутня артеріальна гіпертензія.
- Перед початком застосування левофлоксацину необхідно впевнитись, що у Вас немає порушень сполучної тканини (синдром Марфана, синдром Елерса-Данлоса, синдром Тернера, хвороба Бехчета, ревматоїдний артрит).
- негайно звернутися до Вашого лікаря, якщо Ви помітили такі ознаки, як гостра задишка, новий напад серцебиття або розвиток набряку живота або нижніх кінцівок, раптовий біль в животі, грудях або спині.

ОСНОВНІ МОМЕНТИ, ЯКІ СЛІД ПАМ'ЯТАТИ

- Левофлоксацин підвищує ризик виникнення аневризми та дисекції аорти та регургітації/недостатності серцевого клапана при застосуванні у всіх пацієнтів.
- Якщо Ви не повністю розумієте інформацію, яку отримали, будь ласка, попросіть Вашого лікаря ще раз її пояснити, перш ніж розпочати застосування левофлоксацину.
- НЕ припиняйте застосування левофлоксацину, не обговоривши це питання з Вашим лікарем.
- Даний лікарський засіб призначений саме для Вас - не передавайте його іншим особам, це може; завдати їм шкоди.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340, слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua> та представника компанії Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед, Англія, на території України - ТОВ «БУСТ ФАРМА» що знаходиться за адресою: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 30. Адреса для листування з питань фармаконагляду Товариства: 03022, м. Київ, вул. Сумська, буд. 1, а/с 21, за телефоном: +38 099-770-85-22 або на e-mail: phv@boost-pharma.com.ua