

Ризик онкологічних захворювань

РІНВОК може потенційно збільшити ризик розвитку онкологічних захворювань, особливо раку шкіри.

Повідомте лікаря, якщо ви помітили будь-які зміни у зовнішньому вигляді ділянки шкіри або помітили новоутворення на шкірі.

Покажуйте цю картку усім медичним працівникам, які надають Вам медичну допомогу – наприклад, стоматологу чи лікарю швидкої допомоги.

▼ Цей лікарський засіб підлягає додатковому контролю. Щоб повідомити про будь-які небажані ефекти, зв'яжіться з представництвом ЕббВі Біофармасьютикалз ГмбХ в Україні:
тел.: +380 (44) 498 0800 (#6151),
email: ua_ppd_pv_mailbox@abbvie.com

Про небажані реакції слід також повідомити Державний експертний центр МОЗ України заповнивши повідомлення за посиланням <https://aisf.dec.gov.ua>

Ваше прізвище та ім'я:

Прізвище та ім'я лікаря, який призначив РІНВОК:

Номер телефону лікаря:

Дата початку лікування препаратом РІНВОК:



Картка для пацієнта **Зберігайте цю картку постійно при собі**

**Інформація для пацієнтів
щодо безпеки лікарського засобу
РІНВОК ▼ (упадацитиніб)**

- Ця картка містить важливу інформацію з безпеки, яку вам слід знати до та під час лікування препаратом РІНВОК.
- Для отримання додаткової інформації прочитайте інструкцію для медичного застосування

Ризик інфекцій

РІНВОК може погіршити перебіг існуючої інфекції або підвищити ймовірність зараження новою інфекцією – наприклад, туберкульозом, оперізуючим герпесом або вірусним гепатитом.

Негайно повідомте лікаря, якщо ви помітите такі ознаки інфекції, як:

- Лихоманка, пітливість, озноб, втрата ваги або тривалий кашель – це можуть бути ознаки туберкульозу;
- Болючий висип на шкірі з пухирцями – це може бути ознакою оперізуючого герпесу;
- Відчуття втоми або задишки – це можуть бути ознаки пневмонії.

Вакцини, що застосовуються для профілактики інфекцій

Під час лікування та безпосередньо перед початком лікування лікарським засобом РІНВОК не слід застосовувати живі вакцини (наприклад, вакцина проти грипу у формі назального спрею, вітряної віспи, кору/паротиту/краснухи).

Перш ніж застосовувати будь-які вакцини, поговоріть з лікарем – він знатиме, які вакцини вам не слід застосовувати до або під час лікування лікарським засобом РІНВОК.

Ризик серцевих захворювань

Лікування лікарським засобом РІНВОК було пов'язане з підвищенням холестерину. Тому під час лікування лікарським засобом РІНВОК лікар перевірятиме у вас рівень холестерину.

Негайно повідомте лікаря, якщо помітите такі симптоми як біль або стиснення у грудях, оскільки це можуть бути симптоми серцевого захворювання.

Контрацепція, вагітність та грудне вигодовування

РІНВОК не можна застосовувати під час вагітності.

- Використовуйте ефективну контрацепцію під час лікування лікарським засобом РІНВОК та протягом 4 тижнів після прийому останньої дози лікарського засобу. Поговоріть зі своїм лікарем щодо ефективної контрацепції.
- Негайно повідомте лікаря, якщо ви хочете завагітніти або завагітніли.
- Не годуйте грудьми під час застосування лікарського засобу РІНВОК.

Ризик утворення тромбів у венах або легенях

При застосуванні лікарського засобу РІНВОК відмічали випадки утворення згустків крові у венах або легенях. Негайно повідомте лікаря, якщо у вас з'явилися такі ознаки згустків крові у венах чи легенях, як болючий набряк ніг або біль у грудях.