

Пам'ятка для пацієнта
Дані матеріали є навчальними і не є рекламою.

Контрацепція

Ви зараз використовуєте або приймаєте засоби контрацепції?

Так ☐ Ні ☐

Якщо ТАК, запишіть тут назви _____

Віднесіть цю пам'ятку своєму лікарю чи гінекологу під час наступного візиту, і він/вона зможе порадити, чи потрібно вам використовувати додаткові або альтернативні методи контрацепції.

accord

Важливі попередження з безпеки для пацієнтів, які приймають

БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD)

Ця пам'ятка містить важливу інформацію про БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD). Будь ласка, уважно прочитайте цю пам'ятку перед початком лікування.

Ваше ім'я: _____

Лікар, що призначає: _____

Якщо у Вас виникли запитання щодо БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD), зверніться до лікаря. Повідомлення про побічні реакції на лікарський засіб мають важливе значення. Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340, слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>

accord

Якщо Ви жінка з дітородним потенціалом, уважно прочитайте цю сторінку

Вагітність

БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD) може нашкодити розвитку плода. Тому Ви не повинні приймати БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD), якщо Ви вагітні, а також не повинні завагітнити під час прийому БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD). Крім того, якщо Ви страждаєте на легеневу гіпертензію, вагітність може серйозно погіршити симптоми Вашого захворювання. Якщо Ви підозрюєте, що можете бути вагітні, повідомте свого лікаря.

Контрацепція

Контроль народжуваності за допомогою гормонів – наприклад, оральні контрацептиви або протизаплідні таблетки, гормональні ін'єкції, імплантати або проти-заплідні шкірні пластири не можуть надійно запобігти вагітності у жінок, які приймають БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD). Вам потрібно використовувати бар'єрну форму контролю над народжуваністю – як-от презерватив, діафрагма або вагінальна губка – на додаток до будь-якого з цих видів гормонального контролю народжуваності.

Обов'язково обговоріть будь-які питання, які у вас можуть виникнути, зі своїм лікарем або гінекологом – заповніть дані цієї пам'ятки та віднесіть її своєму лікарю або гінекологу під час наступного візиту. Ви повинні проходити тест на вагітність перед початком застосування лікарського засобу БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD) і щомісяця під час лікування, навіть якщо ви вважаєте, що не вагітні.

Дата першого щомісячного тесту _____

Аналіз крові для визначення функції печінки

У деяких пацієнтів, які приймали БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD) були виявлені відхилення від норми у показниках печінкових тестів. Під час лікування БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD) Ваш лікар організовує регулярні аналізи крові, щоб перевірити наявність змін функціонування печінки.

Не забудьте щомісяця здавати аналіз крові для дослідження функції печінки.

Після збільшення дози через 2 тижні буде проведено додаткове дослідження.

Дата першого щомісячного тесту _____

Ваш щомісячний графік аналізу крові печінки:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Січень | ☐ Травень | ☐ Вересень |
| ☐ Лютий | ☐ Червень | ☐ Жовтень |
| ☐ Березень | ☐ Липень | ☐ Листопад |
| ☐ Квітень | ☐ Серпень | ☐ Грудень |

accord