

Телефон лікуючого лікаря:

ПІБ лікуючого лікаря:

Назва центру:

Дата першого призначення Обаджіо®:

ПІБ пацієнта:

ОБАДЖІО® (терифлуномід)

КАРТКА ПАЦІЄНТА

Ця Картка пацієнта містить важливу інформацію з безпеки, яку потрібно знати під час застосування лікарського засобу Обаджіо®. Будь ласка, ознайомтеся з останньою версією Інструкції для медичного застосування на сайті www.drlz.com.ua



Загальні рекомендації

Будь ласка, покажіть цю картку будь-якому спеціалісту системи охорони здоров'я або медичному працівнику, що бере участь у вашому лікуванні (наприклад, у разі надзвичайної ситуації).

ОБАДЖІО®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 14 мг; РП UA/13689/01/01

Листопад 2024 року

Матеріали є навчальними та не призначені для реклами

sanofi



Важливі побічні реакції

Цей лікарський засіб може впливати на функцію печінки, кров'яний тиск та деякі клітини крові, що важливі для боротьби з інфекціями.

У разі виникнення будь-яких із зазначених побічних реакцій, негайно зверніться до свого лікаря:

- Якщо ваша шкіра або білки очей пожовтіли, сеча стала темною, виникла нудота або блювота та болі в животі. У такому разі можливі проблеми з печінкою.
- Висока температура (лихоманка), кашель, озноб, збільшення лімфовузлів, затруднене або болюче сечовипускання. Це може свідчити про наявність інфекції.



Для жінок з репродуктивним потенціалом, включно з дівчатами та їхніми батьками/опікунами

- Не починайте застосовувати Обаджіо®, якщо ви вагітні або підозрюєте настання вагітності. Лікар може запропонувати провести тест на вагітність для підтвердження.
- Використовуйте надійну контрацепцію під час застосування та після завершення курсу Обаджіо®. Лікар проконсультує вас щодо потенційних ризиків для плода й необхідності застосування ефективної контрацепції
- Зверніться до лікаря, якщо бажаєте змінити метод контрацепції або плануєте завагітніти.
- Якщо ви завагітніли або підозрюєте настання вагітності, припиніть застосування терифлуноміду й **негайно зверніться до лікаря.**
- У разі настання вагітності лікар може порекомендувати лікування, що сприятиме швидкому виведенню терифлуноміду з організму.
- Також обговоріть із лікарем плани щодо грудного вигодовування або його проведення.
- Для батьків/опікунів дівчат: щойно в пацієнтки буде перша менструація, зверніться до лікаря, аби обговорити потенційний ризик для плода й необхідність використання контрацептивів.