

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ДЛЯ ПАЦІЄНКИ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЛЬ ТІН ТА РИЗИК УТВОРЕННЯ ТРОМБІВ

Усі комбіновані контрацептиви, у тому числі Моделль Тін, підвищують ризик утворення тромбів. Загальний ризик формування тромбів внаслідок застосування Моделль Тін є низьким, однак тромби можуть спричинити серйозні проблеми, а в поодиноких випадках – навіть призводити до летальних наслідків.

Дуже важливо, щоб Ви чітко розуміли, коли у Вас може бути підвищений ризик тромбоутворення, які ознаки й симптоми Ви повинні відстежувати, та якими мають бути Ваші дії.

У яких ситуаціях ризик тромбоутворення є найвищим?

- впродовж першого року застосування Моделль Тін (у тому числі в разі відновлення застосування після перерви тривалістю 4 тижні або довше);
- якщо Ви маєте значну надмірну вагу;
- якщо Вам більше 35 років;
- якщо у когось з Ваших родичів відмічалися тромби у відносно молодому віці (наприклад, до 50 років);
- якщо Ви народили дитину впродовж останніх декількох тижнів.

Якщо Ви палите і Вам більше 35 років, наполегливо рекомендується припинити палити або користуватися негормональними засобами контрацепції.

При виникненні будь-якого з нижченаведених симптомів Ви повинні негайно звернутися до лікаря:

- Сильний біль або набряк ноги, що може супроводжуватися чутливістю, жаром або зміною забарвлення шкіри: блідістю, почервонінням чи посинінням. Можливо, у Вас **тромбоз глибоких вен**.
- Раптова задишка або прискорення дихання нез'ясованого походження; сильний біль у грудях, який може збільшуватися при глибокому вдиху; раптовий напад кашлю без явної причини (у тому числі з кровохарканням). Можливо, у Вас відмічається тяжке ускладнення тромбозу глибоких вен, яке називається **тромбоемболія легеневої артерії**. Вона виникає при переміщенні тромбу з нижньої кінцівки до легень.
- Біль у грудях, часто гострий, однак іноді просто відчуття дискомфорту, стиснення, тяжкість або дискомфорт у верхній частині тулубу, що поширюється на спину, щелепу, горло, руку, разом з відчуттям переповнення шлунку та диспепсією, або ядуха, пітливість, нудота чи запаморочення. Можливо, у Вас **інфаркт міокарда**.
- Слабкість чи оніміння м'язів обличчя, руки або ноги, особливо з одного боку; проблеми з мовленням чи розумінням; раптова сплутаність свідомості; раптова втрата чи нечіткість зору; тяжкий головний біль/мігрень, інтенсивніший за звичайний. Можливо, у Вас **інсульт**.

Відстежуйте симптоми тромбоутворення, особливо якщо:

- Вас нещодавно прооперували;

- Ви не пересувались протягом тривалого часу (наприклад, через травму або захворювання, або якщо нога в гіпсі);
- Ви маєте тривалу подорож (більше 4 годин).

Не забувайте повідомляти свого лікаря, медичну сестру або хірурга про те, що приймаєте Моделль Тін, якщо:

- Вам запланована або виконана операція;
- У будь-якій ситуації, коли медичний спеціаліст цікавиться препаратами, які Ви приймаєте.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, прочитайте інструкцію для медичного застосування, або відвідайте сторінку <http://www.dec.gov.ua>.

При підозрі на наявність побічної реакції, пов'язаної із застосуванням препарату, Ви можете повідомити медичного фахівця або ТОВ «Тева Україна» будь-яким зручним для Вас способом: Safety.Ukraine@teva.ua, тел.+38 050 462 17 67; тел.+38044 595 7080.